




Оказание первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути.



При попадании инородного тела в носовой ход и дыхательные пути

- При попадании инородного тела в носовой ход и дыхательные пути медицинский персонал должен быстро оказать квалифицированную помощь, так как малейшее промедление может привести к полной их закупорке и развитию асфиксии (удушьё).
- Если инородное тело попало в носовые ходы, то ребенку закрывают одну ноздрю и просят высморкаться. Если инородное тело осталось, то его удаление из полости носа проводит врач.
- При попадании инородного тела в дыхательные пути ребенка грудного возраста следует перевернуть его вниз головой. Помощь ребенку более старшего возраста заключается в следующем: если при кашле инородный предмет удалить не удастся, медицинская сестра укладывает ребенка животом на согнутое колено, низко опускает голову и легко постукивает рукой по спине. В любом случае необходимо вызвать дежурного врача. При отсутствии эффекта ребенка переводят в реанимационное отделение для бронхоскопии.



Инородное тело гортани.

Неотложная помощь.

При оказании помощи детям до 1 года:

- перевернуть вверх ногами и резко встряхнуть.

Старшим детям:

- проводят перкуссионный массаж спины скользящими поколачиваниями, верхняя часть туловища и голова при этом опущены вниз.



ПРОФИЛАКТИКА УДУШЬЯ У ДЕТЕЙ

Опасные симптомы

Ребенок безрезультатно пытается сделать вдох, при этом синеет. Кашель, шумное свистящее дыхание, обильное слюноотделение. На лице ребенка появляется выражение страха, он машет руками, но не может произнести ни звука.

КАК ИЗБЕЖАТЬ:

- 1 не оставляйте малыша без присмотра во время еды
- 2 не давайте детям еду с мелкими косточками
- 3 в период введения прикорма (твердой пищи) нужно быть особенно внимательным: не кормите кроху вопреки его желанию
- 4 не играйте с ребенком во время еды
- 5 не давайте ребенку мелкие игрушки или игрушки от которых можно оторвать деталь
- 6 уберите все мелкие предметы (пуговицы, бусы, конструктор) в недоступные места
- 7 уберите мягкие игрушки из кровати во время сна грудного ребенка (они могут упасть на лицо и закрыть дыхательные пути)
- 8 приучайте ребенка спать в своей кроватке. Во время сна в одной постели грудной ребенок, прижатый телом взрослого, может задохнуться

25%
несчастных случаев
происходит
с детьми до года
по безопасности
взрослых



ГБУЗ ЯНАО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ»



Присоединяйтесь в социальных сетях

#ямалздоров

- Устранение механической асфиксии у детей



Асфиксия у детей до 1 года и ее профилактика

Асфиксия - это удушье, вызванное сдавливанием дыхательных путей, закрытием их слизью, пищей, мягкими предметами, сдавлением шеи, грудной клетки и живота.

Все это в итоге может привести к смерти ребенка

У младенцев это состояние может быть вызвано:

- прикрытием дыхательных путей ребенка посторонними предметами: подушкой, одеялом, игрушкой
- прикрытием дыхательных путей грудью матери во время кормления
- попаданием инородных тел в дыхательные пути: мелких игрушек, пуговиц, колец, монет и т.д.
- поперхиванием и попаданием молока или другой пищи не в пищевод ребенка, а в гортань, иногда бронхи
- частыми срыгиваниями
- сдавливанием области шеи цепочками с крестиками или талисманами, тесьмой с соской
- сном в одной кровати с родителями, другими детьми

Большинство родителей не понимают риск асфиксии у младенцев!

Позиционная асфиксия может случиться с кем угодно, но она чаще всего встречается у младенцев, когда ребенок не может получить достаточно кислорода, чтобы дышать из-за положения своего тела. Некоторые полагают, что этот тип удушья является результатом того, что младенец оказывается в ловушке между поверхностью, прикрывая нос и/или рот и ограничивая воздух. И хотя это, безусловно, является причиной некоторой позиционной смертности от асфиксии у младенцев, это, безусловно, не объясняет все случаи.

Младенцы в возрасте до четырех месяцев не имеют надлежащего контроля над головой и шеей и не могут двигать головой в случае нарушения дыхательных путей. И пугающим фактом является то, что их маленькие дыхательные пути могут затормозиться только из-за наклона их головы (например, когда их подбородок находится напротив их груди).

Родители должны:

- Спите в одной комнате с ребенком, пока ему не исполнится год.
- Используйте теплую одежду вместо одеял.
- Положите ребенка спать на ровной поверхности.
- Держите ребенка подальше от вторичного и пассивного курения.
 - Положите ребенка спать на спине.
 - Создайте безопасное место без подушек и одеял.
 - Воздерживайтесь от употребления наркотиков и алкоголя.
 - Вакцинируйте ребенка.